

Myelofibrose

Hvert år får ca. 50 personer stillet diagnosen myelofibrose

Myelofibrose rammer mænd og kvinder lige meget. Det er som oftest personer i aldersgruppen over 60 år, der får stillet diagnosen.

Ved myelofibrose bliver knoglemarven omdannet til arvæv og mister evnen til at danne blodceller.

Myelofibrose er én i en gruppe af tre beslægtede blodkræftsygdomme under betegnelsen de kroniske myeloproliferative neoplasier (MPN). MPN-sygdommene omfatter polycytæmia vera (PV), essentiel trombocytose (ET) og myelofibrose (primær myelofibrose).

På denne side kan du læse om Myelofibrose. Læs og [Polycytæmi Vera](#).

- [Fakta](#)
- [Diagnose](#)
- [Behandling](#)

Fakta om Myelofibrose

I knoglemarven dannes vores blodceller. Myelofibrose påvirker knoglemarven og medfører at den erstattes af arvæv.

Konsekvensen er, at knoglemarvens evne til at danne normale blodceller aftager. Milten og derefter leveren forsøger at kompensere for dette ved at danne blodceller, hvilket betyder, at disse organer kan blive forstørret.

Patienter med myelofibrose kan føle sig stærkt svækket med manglende energi og en udpræget træthed. Patienterne kan opleve mæthedsfølelse, åndenød, koncentrationsbesvær, vægttab, feber og svedtendens eller gener fra en forstørret milt. Andre symptomer kan være kløe, infektioner, blødninger i hud og slimhinder, knogle- og ledsmerter og mavesmerter. Der kan udvikles blodpropper i hjernen, hjertet eller andre organer.

Diagnose af Myelofibrose

Det er forskelligt, hvordan myelofibrose opdages. Nogle gange opdages myelofibrose ved en tilfældighed i forbindelse med en blodprøve taget i en anden sammenhæng. Andre gange er det patientens sygehistorie, der giver mistanke om, at dannelsen af blodceller ikke fungerer, som den skal. Blodmangel ses oftest. En stærkt forstørret milt kan også ofte medføre mistanke om sygdommen.

Ved myelofibrose kan blodprøver afsløre "blodmangel" (anæmi). Ved at se på blodet i et mikroskop, vil man ofte se mange umodne celleformer af både røde og hvide blodlegemer. Dette skyldes ufuldstændig modning af cellerne på grund af den defekte knoglemarv. Knoglemarven er ofte så fattig på celler, at det kan være vanskeligt for lægen at få materiale ud.

Behandling af Myelofibrose

Behandlingen af myelofibrose er meget individuel, alt efter hvilke symptomer der opleves. Normalt er målet for behandlingen at reducere eventuelle symptomer og forbedre livskvaliteten. Hvis der ikke opleves symptomer, efter diagnosen er stillet, kan behandlingen blot indebære regelmæssige kontroller og blodprøver samt råd fra lægen om en sund levevis. Hvis symptomer eller sygdommen udvikler sig, skal en passende behandling påbegyndes.

En forstørret milt er et almindeligt symptom på myelofibrose, og det vil ofte betyde smerter, ubehag, mæthedsfølelse eller nedsat appetit. Andre symptomer omfatter: feber, nattesved, knoglesmerter og vægttab.

Inden for medicinsk behandling findes der kemoterapi, interferoner og JAK-hæmmere. Hvis fjernelse af milten bliver nødvendigt, gøres det ved kirurgi (splenektomi).

Blodmangel er almindelig hos personer med myelofibrose. Symptomer omfatter over-dreven træthed, svaghed og kortåndethed. Hvis disse symptomer giver problemer, kan man behandle med blodtransfusioner eller en medicinsk behandling til dannelse af røde blodceller.

Der er flere muligheder for behandling af myelofibrose, alt afhængig af sygdomsforløbet. Det skal man tale med sin læge om.

DK2303219986

Source URL: <https://www.novartis.com/dk-da/patienter-og-paaroerende/sygdomsomraader/myelofibrose>

List of links present in page

- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/patienter-og-paaroerende/sygdomsomraader/myelofibrose>
- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/69086>
- [#tabfakta-5166](#)
- [#tabdiagnose-5171](#)
- [#tabbehandling-5176](#)
- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/50351>
- <https://www.novartis.com/dk-da/node/50351/printable/print>
- <https://www.novartis.com/dk-da/node/50351/printable/pdf>
- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/50356>
- <https://www.novartis.com/dk-da/node/50356/printable/print>
- <https://www.novartis.com/dk-da/node/50356/printable/pdf>
- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/50361>
- <https://www.novartis.com/dk-da/node/50361/printable/print>
- <https://www.novartis.com/dk-da/node/50361/printable/pdf>