

Diagnose CLL

Diagnose af CLL

For at stille diagnosen er det nødvendigt med en grundig udredning.

Ofte er det patientens sygehistorie der giver mistanke til sygdommen. Sygdommen opdages ofte tilfældigt, da op 60 % af patienter ikke oplever symptomer. Dette er ofte i forbindelse med en blodprøve taget af en helt anden årsag.

Der er opstillet forskellige systemer til at undersøge hævede lymfeknuder på halsen, i armhulerne eller i lysken.

Lægen anvender en stadietinddeling, som er et system, der er baseret på placeringen af de hævede lymfeknuder og en analyse af knoglemarven. Det mest simple system inddeler i tre stadier: A, B, eller C, hvor stadium A og B afhænger af antallet af områder med hævede lymfeknuder, og om milten eller leveren er forstørret og hvor stadium C afhænger af enten blodmangel eller lavt antal blodplader pga. knoglemarvssvigt.

Efter stadietinddelingen er det muligt at diagnosticere patienten og få et billede af hvordan sygdommen vil forløbe. Hvis man er i stadium A eller B, er der stor sandsynlighed for, at behandling endnu ikke er nødvendig.

Source URL: <https://www.novartis.com/dk-da/node/50486>

List of links present in page

- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/50486>
- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/50486/printable/print>
- <https://www.novartis.com/dk-da/dk-da/node/50486/printable/pdf>